


CAUTIONS / PRÉCAUTIONS: not for use by children or pregnant or lactating women. If you have heart disease, high or low blood pressure, kidney or liver disorder, diabetes, or edema (swelling of hands, face, or feet), or are taking other diuretic products, do not use. Do not discontinue any medications without consulting your doctor. Consult a health care practitioner prior to use if you have erectile dysfunction (ED) or if you are following a diet rich in potassium and/or nitrates (e.g., plants from the Amaranthaceae family such as beets, spinach, etc.). Stop use and seek medical attention immediately if you experience dizziness, confusion, muscle weakness or pain, abnormal heartbeat, and/or difficulty breathing, or if you have symptoms such as severe nausea, vomiting, diarrhea, or abdominal cramps. If the following symptoms appear – weakness, confusion, headache, difficulty breathing, and/or pale, grey, or blue-coloured skin – stop use and consult a health care practitioner. These symptoms may be signs of methemoglobinemia, a rare disorder, which may appear up to 2 hours after use. / ce produit ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou qui allaitent. Les personnes ayant une maladie du cœur, de l'hypertension ou hypertension artérielle, un trouble rénal ou hépatique, le diabète ou un œdème (gonflement des mains, du visage ou des pieds) ou qui prennent des produits diurétiques ne peuvent pas prendre ce produit. Il ne faut pas cesser de prendre aucun médicament sans consulter son médecin au préalable. Les personnes ayant une dysfonction érectile ou suivant un régime élevé en potassium et/ou nitrates (c.-à-d., des plantes de la famille des amarantacées telles que betteraves, épinards, etc.) doivent consulter un professionnel de santé avant d'en faire usage. Cesser d'utiliser et obtenir de l'aide médicale immédiatement en cas d'étourdissement, confusion, faiblesse ou douleur musculaire, battements cardiaques anormaux et/ou difficulté à respirer; ou en cas de symptômes tels que nausée aiguë, vomissement, diarrhée ou crampes abdominales. Si les symptômes suivants se manifestent – faiblesse, confusion, mal de tête, difficulté à respirer et/ou pâleur ou peau grisâtre ou bleuâtre, cessez l'usage et consultez un professionnel de santé. Ces symptômes pourraient être des signes de méthémoglobinémie, une maladie rare, qui peut se manifester jusqu'à 2 heures après usage.

CN352A



Blood Pressure Pression Artérielle

Helps support healthy
blood pressure
Aide au soutien d'une pression artérielle saine



NPN 80057364

60 TABLETS / COMPRIMÉS

DOSAGE: ADULTS / ADULTES: 2 tablets together, once daily, with food. For prolonged use, consult your health care practitioner. / 2 comprimés ensemble, une fois par jour, avec des aliments. Pour tout usage prolongé, consulter un professionnel de santé.

MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:

each tablet contains / chaque comprimé contient:

Potassium nitrate / Nitrate de potassium	416 mg
Magnesium (magnesium oxide) / Magnésium (oxyde de magnésium)	100 mg
Quercetin (quercetin dihydrate) / Quercétine (dihydrate de quercétine)	100 mg
Vitamin C (ascorbic acid) / Vitamine C (acide ascorbique)	50 mg
Grape seed extract / Extrait de pépin de raisin (<i>Vitis vinifera</i>) 40:1	50 mg
Beet root powder / Poudre de racine de betterave (<i>Beta vulgaris</i>)	50 mg
Spinach leaf powder / Poudre de feuille d'épinard (<i>Spinacia oleracea</i>)	25 mg

NON-MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX:

citric acid, croscarmellose sodium, hydroxylated soy lecithin, hypromellose, magnesium stearate, maltodextrin, microcrystalline cellulose, silicon dioxide, / acide citrique, cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, dioxyde de silicium, hypromellose, lécithine de soja hydrolysée, maltodextrine, stéarate de magnésium.

Store in a cool, dry place. Do not use if seal is broken.
Ranger dans un lieu frais et sec. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Imp. by/par: Shaklee Canada Inc.
Oakville, ON L6L 0C4
1.800.263.9138 / ca.shaklee.com



57067