

La nouvelle norme dorée en matière de puissance antioxydante

REGAIN CURCUMA

Ajoutez la puissance antioxydante à votre routine quotidienne avec Regain Curcuma. Chaque capsule contient 475 mg de curcuminoïdes, l'ingrédient actif principal du curcuma. Plus un extrait de poivre noir normalisé pour contenir 95 % de pipérine.

57885 | 60 CAPSULES



Sans gluten



Végétalien


Qu'est-ce qui distingue Regain Curcuma?

- Contient 475 mg (par capsule) de curcuminoïdes – plus que les autres marques sur le marché
- Contient 5 mg (par capsule) d'extrait de poivre noir: un ingrédient-clé qui améliore l'absorption et augmente la biodisponibilité^{1 2}
- Source d'antioxydants

Regain Curcuma

Dosage: ADULTES (18 ans et plus): 1 capsule par jour avec un repas.

	Quantité par capsule
Curcuminoïdes (<i>Curcuma longa</i> - rhizome)	475 mg
Extrait de poivre noir (95 % de pipérine) (50:1, 250 mg) (<i>Piper nigrum</i> - fruit)	5 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CELLULOSE MICROCRISTALLINE, DIOXYDE DE SILICIUM, HYPROMELLOSE, STÉARATE DE MAGNÉSIUM, TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE. 

AVERTISSEMENTS:

Regain Curcuma n'est pas conçu pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Veuillez consulter votre médecin si vous êtes enceinte, vous allaitez ou vous avez moins de 18 ans. Veuillez lire l'étiquette du produit pour plus de détails à propos des précautions.

1 Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence de la pipérine sur la pharmacocinétique de la curcumine chez les animaux et les humains volontaires. *Planta Med* 64(4):353-356, 1998. [2 grammes de curcumine versus 2 grammes de curcumine plus 20 mg de pipérine; hommes adultes en santé; grande amélioration des niveaux sanguins de curcuminoïdes].

2 Prasad S, Amit K, Tyagi AK, Aggarwal BB. Récent développements dans la libération, la biodisponibilité, l'absorption et le métabolisme de la curcumine: un pigment doré tiré d'une épice dorée. *Cancer Res Treat* 46(1):2-18, 2014. Publié en ligne 2014 janv. 15. doi: 10.4143/crt.2014.46.1.2 [Revue] Le référence 1 est une étude clinique principale de la pharmacocinétique de la curcumine et de la pipérine; la référence 2 est une revue complète de la biodisponibilité améliorée des formulations.

La Différence Shaklee^{MC}

SÛR, ÉPROUVÉ, GARANTI

Regain Curcuma Shaklee offre une quantité supérieure de curcuminoïdes comparativement aux autres marques sur le marché.

Regain Curcuma est:

- Offert au Canada et aux États-Unis
- Végétalien
- Kascher Star-K
- Fabriqué aux É.-U.
- Sans gluten

Innovation, qualité et innocuité

Chez Shaklee, nous nous engageons à l'innovation par le biais de la science et nous nous tournons vers la nature pour trouver les solutions qui peuvent procurer une vie plus saine. Nous assurons la plus haute qualité et les normes d'innocuité les plus rigoureuses en menant plus de 100 000 tests de la qualité par année pour garantir que nos produits sont sûrs pour vous et votre famille.



100 % SÛR
100 % ÉPROUVÉ
100 % GARANTI

FAQ

Quelle est la différence entre la racine de curcuma et l'extrait de curcuma?

La curcumine est présente dans la racine du curcuma, mais seulement en petite quantité. Une racine moyenne de curcuma contient moins de 5 % de curcumine et cette quantité varie d'une racine à l'autre. D'autre part, les extraits de curcuma sont faits par l'extraction de la curcumine dans la racine du curcuma et ils sont normalisés pour contenir des quantités concentrées de curcumine. Chaque capsule de Regain Curcuma inclut 475 mg de curcuminoïdes.

Pourquoi avons-nous ajouté de l'extrait de poivre noir à la formule?

Puisque la curcumine est reconnue pour avoir un niveau d'absorption relativement bas, chaque capsule de Regain Curcuma contient 5 mg d'extrait de poivre noir (*Piper nigrum*): un ingrédient-clé qui améliore l'absorption et augmente la biodisponibilité^{1,2}

Peut-on prendre les capsules de Regain Curcuma à n'importe quel moment de la journée?

On peut prendre les capsules de Regain Curcuma à n'importe quel moment de la journée, mais il est préférable de le prendre avec un repas (c.-à-d., une boisson frappée).

1 Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence de la pipérine sur la pharmacocinétique de la curcumine chez les animaux et les humains volontaires. *Planta Med* 64(4):353-356, 1998. [2 grammes de curcumine versus 2 grammes de curcumine plus 20 mg de pipérine; hommes adultes en santé; grande amélioration des niveaux sanguins de curcuminoïdes].

2 Prasad S, Amit K, Tyagi AK, Aggarwal BB. Récent développements dans la libération, la biodisponibilité, l'absorption et le métabolisme de la curcumine: un pigment doré tiré d'une épice dorée. *Cancer Res Treat* 46(1):2-18, 2014. Publié en ligne 2014 janv. 15. doi: 10.4143/crt.2014.46.1.2 [Revue] Le référence 1 est une étude clinique principale de la pharmacocinétique de la curcumine et de la pipérine; la référence 2 est une revue complète de la biodisponibilité améliorée des formulations.